



Către,

PROPRIETARI DE PĂSĂRI DIN LOCALITATEA.....

În urma efectuării analizei de risc epidemiologic, de către D.S.V.S.A. Ialomîța, în direcția gripei aviare, localitatea dumneavoastră se încadrează în zona epidemiologică cu risc înalt pentru influența aviară înalt patogenă (HPAI).

Având în vedere acest fapt aveți obligativitatea respectării permanente a următoarelor măsuri:

- ✓ prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă și păsările domestice, în special rațe și găște; astfel este interzis accesul păsărilor domestice la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală;
- ✓ menținerea păsărilor în spații închise și utilizarea de apă și furaje care să prevină contaminarea acestora cu virusurile influenței aviare;
- ✓ separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților a rațelor și găștelor de alte păsări domestice;
- ✓ interzicerea adăpării păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice;
- ✓ interzicerea intrării mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor domestice, mișcările limitându-se la o singură persoană (proprietarul exploatației);
- ✓ este interzisă organizarea de prezentări de animale, expoziții, manifestări culturale, târguri și piețe cu profil avicol;
- ✓ obligativitatea notificării medicului veterinar de liberă practică concesionar și a D.S.V.S.A. Ialomîța asupra oricărei suspiciuni de boală, caz de mortalitate și morbiditate manifestate la păsările aflate în proprietate;
- ✓ depozitarea hranei pentru păsările domestice într-un mod protejat de păsările sălbatice sau alte animale.

Nerespectarea acestor măsuri reprezintă încălcări ale legii. Aceste încălcări pot fi sancționate cu amenzi până la 3600 lei.

Pentru informarea corectă a dumneavoastră, în vederea recunoașterii rapide a bolii, vă prezentăm principalele semne clinice care pot fi atribuite gripei aviare:

- ✓ rata crescută a mortalității tuturor categoriilor de vârstă din speciile receptive;
- ✓ scăderea semnificativă a consumului de apă și furaje;
- ✓ diminuarea producției de ouă și obținerea de ouă cu coaja moale;
- ✓ diaree, respirație dificilă și lăcrimare excesivă;
- ✓ edeme (umflături) ale capului și gâtului și semen nervoase (poziții anormale ale capului și gâtului, imposibilitatea deplasării).

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV
Dr. Mihai Puia
Medic primar veterinar

Pagina 1 din 1